

NITROFURANTOIN (MACRODANTIN®)

10mg/ml SUSPENSION ORALE

INDICATION:

Antibiotique utilisé dans le traitement des infections du tractus urinaire

MATÉRIEL:

INGRÉDIENTS	CONCENTRATION	QUANTITÉ
Nitrofurantoïn/Macrodantin ^{MD}	50mg/co.	20
Ora-Sweet/Ora-Plus	1 :1	QS 100ml

Mortier et pilon

Vase gradué et tige de verre

Bouteille ambrée

PROCÉDURES:

- (a) Triturer les comprimés dans un mortier; ajouter quelques gouttes d'Ora-Sweet pour former une pâte homogène;
- (b) Ajouter graduellement l'Ora-Sweet et mélanger jusqu'à une consistance homogène;
- (c) Transvider dans un cylindre gradué et rincer le mortier avec le reste du véhicule afin d'obtenir le volume désiré soit 100 m. Bien mélanger;
- (d) Transvider dans une bouteille ambrée.

ÉTIQUETTE :

Nitrofurantoin 10mg/ml Suspension orale #25ml Bien agiter Stable 91 jours à température ambiante Protéger de la lumière Préparée le : _____ Expire le : _____ Initiales : _____

STABILITÉ:

Stable 91 jours température pièce ou au réfrigérateur. Protéger de la lumière.

RÉFÉRENCES:

Enson MHH, Decarie D. Stability of nitrofurantoin in extemporaneously compounded suspensions. Can J Hosp Pharm 2006; 59(1):29-33.